

# 乳幼児の予防接種（定期の予防接種：A類疾病）

忘れていませんか？乳幼児の予防接種。順調に受けられているかどうか確認してみましょう。

注）新型コロナウイルスワクチン接種の前後2週間あける。

予防接種の種類	法律等で定められている接種期間及び回数	望ましい接種時期	他の予防接種をする場合の接種間隔
ヒブワクチン (Hib)	1期初回：生後2か月～60か月未満 (初回接種を生後12月に至るまでの間に4週間～8週間までの間隔で3回接種)	生後2～7か月未満	接種間隔の制限なし
	1期追加：生後2か月～60か月未満 (1期初回終了後、7か月～13か月の間隔をあけて1回接種)	初回接種終了後、7～13か月	
小児用肺炎球菌 (13価結合型)	1期初回：生後2か月～60か月未満 (初回接種を生後24月に至るまでの間に27日間以上の間隔で3回接種)	生後2～7か月未満	接種間隔の制限なし
	1期追加：生後2か月～60か月未満 (1期初回終了後、生後12月に至った日以降に60日間以上の間隔をあけて1回接種)	12～15か月齢	
BCG	生後1歳未満(1回接種)	生後5～8か月	注射生ワクチンは27日以上の間隔 その他ワクチンは制限なし
四種混合(DPT-IPV) ジフテリア・百日せき ・破傷風ー不活化ポリオ 三種混合(DPT)	1期初回：生後2か月～7歳6か月未満 (初回接種を20日～56日までの間隔で3回接種)	生後2～12か月	接種間隔の制限なし
	1期追加：生後2か月～7歳6か月未満 (1期初回終了後、6か月以上の間隔をあけて1回接種)	初回接種終了後、12～18か月	
麻しん・風しん (MR)	1期：生後12か月～24か月未満 (麻しん・風しん混合ワクチンを1回接種)	1歳になったらできるだけ早く	注射生ワクチンは27日以上の間隔 その他ワクチンは制限なし
	2期：5歳以上7歳未満であって、小学校に就学する 前年の4月1日から翌年の3月31日までの間 (麻しん・風しん混合ワクチンを1回接種)	小学校就学の前年	
日本脳炎	1期初回：生後6か月～7歳6か月未満 (6日から28日までの間隔で2回接種)	3歳	接種間隔の制限なし
	1期追加：生後3か月～7歳6か月未満 (1期初回終了後、概ね1年後に1回接種)	4歳	
水痘	1回目：生後12か月～36か月未満 (水痘ワクチンを1回接種)	生後12～15か月	注射生ワクチンは27日以上の間隔 その他ワクチンは制限なし
	2回目：生後12か月～36か月未満 (1回目の接種終了後、6か月から12か月の間隔で1回接種)	初回接種終了後、6～12か月	
B型肝炎	1回目：2か月～9か月に至るまで	生後2か月～9か月	接種間隔の制限なし
	2回目：生後1歳に至るまで (1回目の接種終了後、27日以上の間隔をあけて1回接種)		
	3回目：生後1歳に至るまで (1回目の接種終了後、139日以上の間隔をあけて1回接種)		
ロタウイルス	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(ロタリックス)1価 初回は生後6週以降(遅くとも14週6日までに接種開始)から生後24週まで 接種回数2回	生後2か月から	接種間隔の制限なし
	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(ロタテック)5価 初回は生後6週以降(遅くとも14週6日までに接種開始)から生後32週まで 接種回数3回	生後2か月から	